

Beleegyező nyilatkozat hörgőtükrözéses vizsgálatához

Beteg neve:

TAJ szám:

Születési idő:

Thrombocyta szám:

INR:

A hörgőtükrözés diagnosztikus (vérköpés, nehezen felszívódó tüdőgyulladás, befolyásolhatatlan ingerköhögés, daganat gyanúja stb..) és terápiás (pl.: idegentest eltávolítás, váladékretenció) céljából végezhető vizsgálat.

A vizsgálat **Syncumar, Astrix, Aspirin, Colfarit, Aspirin, Ticlid, Ipaton, Plavix** szedése mellett nem végezhető a fokozott vérzésveszély miatt, ezért ezen gyógyszerek szedéséről tájékoztassa orvosát.

Fraxiparin, Clexan injekciót előző nap este és aznap reggel ne adja be!

Cukorbetegség, epilepsziás előzmény, Lidocain és egyéb gyógyszerérzékenység esetén tájékoztassa kezelőorvosát!

Ha ön cukorbeteg, akkor az inzulint, ill. erre vonatkozó gyógyszereit a vizsgálat előtt ne szedje be. Életfontosságú, rendszeresen szedett gyógyszereit a kezelőorvossal egyeztetett időpontban minimális vízzel beveheti.

A tükrözés reggelén sem ételt, sem italt nem fogyaszthat a félrenyelés veszélye miatt.

A vizsgálat helyi érzéstelenítésben történik, a garat, gége képleteit Lidocain sprayvel fűjjük be. A műszer bevezetése szájon át történik, de indokolt esetben orrlyukon keresztül is vizsgálunk. A hörgőtükrözés során fájdalmat nem fog érezni, az esetleges köhögés uralható a műszer munkacsatornáján keresztül adható gyógyszerekkel.

A vizsgálat során többféle mintavételi lehetőségre van mód, ami csak abban az esetben történik, ha a beteg kórisémzéséhez szükséges (váladékleszívás, szövettani mintavétel).

A lehetséges szövődmények közül a vérzésveszély miatt előzőleg véralvadási vizsgálatokat végzünk Önnél. Normális véralvadási értékek mellett fellépő vérzések a műszer munkacsatornáján keresztül uralhatók.

Ha a tüdőelváltozása a mellhártya közelében van, a mintavétel során légmell alakulhat ki.

Ezért ezeket a vizsgálatokat mindig a biztonság növelése érdekében és állandó ellenőrizhetőség miatt röntgen átvilágító készülék kontrolljával végezzük.

A vizsgálat után 2 órán keresztül sem enni, sem inni nem szabad a félrenyelés veszélye miatt.

Az ambuláns beteg a rendelőt csak a vizsgálatot végző orvossal történt megbeszélés után hagyhatja el.

Fentieket tudomásul véve a vizsgálat lényegét megértettem, a hörgőtükrözésbe beleegyezem:

Mohács,

.....
beteg aláírása

.....
orvos aláírása