

Betegtájékoztató
Hiszteroszkópia

Hiszteroszkóppal a méh üregében lévő esetleges elváltozásokról tájékozódhatunk, illetve esetenként ezen elváltozások műtéti megoldását is elvégezhetjük.

A beavatkozás elvégzése az alábbi esetekben javasolt:

Diagnosztikus célból

- Meddőség
myoma eltávolítása
- Vérzészavarok
- Méh nyálkahártyájának eltávolítása

Operatív célból

- Méhben lévő sövény, idegentest, polypus,
- Szövetteni vizsgálatra anyagvétel
- Meddővé tétel (sterilizáció)

A beavatkozás altatásban történik, a méhet a beavatkozás közben széndioxid- gázzal (CO₂) vagy cukoroldattal feltöltjük, így a méh ürege jobban áttekinthető és az esetleges beavatkozások elvégzése is könnyebb.

Lehetséges szövődmények:

A méh perforációja (átfúródása) kb. 1 ezrelékben. (Ilyenkor laparoszkópia vagy hasműtét végzése is szükségessé válhat.)

Vérzés

Fertőzés

A narkózis (altatás) szövődményei.

.....
A kezelő orvos aláírása

.....
A beteg vagy törvényes
képviselőjének aláírása